

SNU 4541.664A Program Analysis Note 3

Prof. Kwangkeun Yi

정리: 궁극을 드러내는 의미(*denotational semantics*)

- 모든 컴퓨터 프로그램의 의미(의미방정식의 해)는 의미공간 CPO의 한 원소이고, 그것은 의미방정식에 해당하는 연속함수의 최소 고정점(*least fixpoint*)으로 정의된다.
- 함수의 최소 고정점으로 정의된 프로그램의 의미에 대한 성질을 증명하는 데는 고정점 귀납법(*fixpoint induction*)이 유용하게 사용된다. 단, 그 성질이 품에 넣는 성질(*inclusive assertion*)일 때에만.

■ 프로그램 C 의 의미

$$\llbracket C \rrbracket = \mathcal{F}(\llbracket C \rrbracket) \quad C \text{의 의미 방정식}$$

$$\llbracket C \rrbracket \in D$$

$$\mathcal{F} \in D \rightarrow D$$

일 때,

$$\begin{aligned}\llbracket C \rrbracket &= \text{fix } \mathcal{F} \quad C \text{의 의미} \\ &= \bigsqcup_{i \geq 0} (\mathcal{F}^i \perp)\end{aligned}$$

■ 의미의 성질 $P(\llbracket C \rrbracket)$ 을 증명하려면: P 가 “품에 넣는 성질” 일 때

$$\forall x \in \{\perp, \mathcal{F}\perp, \mathcal{F}(\mathcal{F}\perp), \dots\}. P(x)$$

를 증명하면 됨

$$\begin{aligned}
 M \in Memory &= Var \rightarrow Value \\
 z \in Value &= \mathbb{Z}_{\perp} \\
 x \in Var &= ProgramVariable_{\perp} \\
 \llbracket C \rrbracket &\in Memory \rightarrow Memory \\
 \llbracket E \rrbracket &\in Memory \rightarrow Value
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \llbracket \text{skip} \rrbracket &= \lambda M. M \\
 \llbracket x := E \rrbracket &= \lambda M. M\{x \mapsto \llbracket E \rrbracket M\} \\
 \llbracket \text{if } E C_1 C_2 \rrbracket &= \lambda M. \text{if } \llbracket E \rrbracket M \neq 0 \text{ then } \llbracket C_1 \rrbracket M \text{ else } \llbracket C_2 \rrbracket M \\
 \llbracket C_1 ; C_2 \rrbracket &= \lambda M. \llbracket C_2 \rrbracket (\llbracket C_1 \rrbracket M) \\
 \llbracket \text{while } E C \rrbracket &= fix(\lambda X. (\lambda M. \text{if } \llbracket E \rrbracket M \neq 0 \text{ then } X(\llbracket C \rrbracket M) \text{ else } M)) \\
 \llbracket n \rrbracket &= \lambda M. n \\
 \llbracket E_1 + E_2 \rrbracket &= \lambda M. (\llbracket E_1 \rrbracket M) + (\llbracket E_2 \rrbracket M) \\
 \llbracket \neg E \rrbracket M &= \lambda M. -(\llbracket E \rrbracket M)
 \end{aligned}$$

소풍: 고정점(*fixpoint*) 예

"Computer science is full of fixpoints."

귀납적/재귀적으로 표현되는 것 = 최소 고정점(*least fixpoint*)을 의미:

- $N = \{0\} \cup \{n+1 \mid n \in N\}$

$$N = \text{fix} \lambda X. \{0\} \cup \{n + 1 \mid n \in X\}$$

- $\text{list} = \{\text{nil}\} \cup \{(0, l) \mid l \in \text{list}\}$

$$\text{list} = \text{fix} \lambda X. \{\text{nil}\} \cup \{(0, l) \mid l \in X\}$$

- $\text{reach}(N) = N \cup \text{reach}(\text{next}(N))$

$$\text{reach} = \text{fix } \lambda f. (\lambda N. N \cup f(\text{next}(N)))$$

- $\text{sort}(A) = \text{if sorted}(A)? A : \text{sort}(\text{exch}(A))$

$$\text{sort} = \text{fix } \lambda f. (\lambda A. \text{if sorted}(A)? A : f(\text{exch}(A)))$$

- $\text{fac}(n) = \text{if } n=0? 1 : n * \text{fac}(n-1)$

$$\text{fac} = \text{fix} \lambda f. (\lambda n. \text{if } n = 0? 1 : n \times f(n - 1))$$

- $\text{repeat } C \ E = C ; \text{ if } E \ (\text{repeat } C \ E) \ \text{skip}$

$$[\![\text{repeat } C \ E]\!] = \text{fix} \lambda X. ((\lambda M. \text{if } [\![E]\!] M? XM : M) \circ [\![C]\!])$$

고정점 귀납법(*fixpoint induction*) 예

$$\begin{aligned} & \llbracket \text{while } E \ C \rrbracket \\ &= \text{fix} \lambda X. (\lambda M. \text{if } \llbracket E \rrbracket M \neq 0 \text{ then } X(\llbracket C \rrbracket M) \text{ else } M) \\ & \llbracket \text{repeat } C \ E \rrbracket \\ &= \text{fix} \lambda X. ((\lambda M. \text{if } \llbracket E \rrbracket M? XM : M) \circ \llbracket C \rrbracket) \end{aligned}$$

$$\text{증명: } \llbracket C ; \text{while } E \ C \rrbracket = \llbracket \text{repeat } C \ E \rrbracket$$

$$\begin{aligned} \llbracket C ; \text{while } E \text{ } C \rrbracket &= (\text{fix } F_w) \circ \llbracket C \rrbracket \\ \llbracket \text{repeat } C \text{ } E \rrbracket &= \text{fix } F_r \\ F_w, F_r &= \dots \end{aligned}$$

증명할 것은

$$\forall C, E. (\text{fix } F_w) \circ \llbracket C \rrbracket = \text{fix } F_r$$

- 품에 넣는 성질(*inclusive predicate*)? 예
- 어떤 고정점에 대한 성질? 연속함수 G 의 최소고정점에 대한:

$$G = \lambda \langle x_1, x_2 \rangle. \langle F_w x_1, F_r x_2 \rangle$$

왜냐면 $\text{fix } G = \langle \text{fix } F_w, \text{fix } F_r \rangle$

증명할 것:

$$P(fixF_w, fixF_r) \stackrel{\text{let}}{=} (\forall C, E. (fixF_w) \circ \llbracket C \rrbracket = fixF_r)$$

고정점 귀납법(*fixpoint induction*)으로

- $P(\perp, \perp) \wedge P(F_w\perp, F_r\perp) \wedge P(F_w^2\perp, F_w^2\perp) \wedge \dots ? \rightleftharpoons$,
- $P(\perp, \perp)$ 이고 $P(f, g) \Rightarrow P(F_w f, F_r g)$ 인가?